



Tric

Tricomoniasis

Tric es el nombre corto de la Tricomoniasis. Esta ETS (enfermedad de transmisión sexual) común es causada por pequeños parásitos llamados protozoos. Viven en las áreas húmedas de los genitales de las personas infectadas, como la uretra en los hombres y la vagina en las mujeres. La tric se transmite de una persona a otra durante la relación sexual.

La tric no produce daños duraderos pero las mujeres pueden tener bebés prematuros o demasiado pequeños como para que sean saludables. En los hombres, puede irritar la glándula prostática. Padecer de tric puede facilitar el contagio de otras ETS, incluyendo el VIH. La tric debería ser tratada de inmediato.



Indicios y síntomas



La tric causa inflamación en la vagina, en las mujeres y en la uretra, en los hombres. Las personas no siempre presentan síntomas. Si existen síntomas, generalmente aparecen de 5 a 28 días después del contacto con una pareja infectada. No obstante, los síntomas también pueden aparecer 6 meses o incluso años más tarde.

En las mujeres, el indicio clave es un flujo espumoso, amarillo-verdoso con olor desagradable. También puede haber picazón e irritación en la vagina. Otro indicio es dolor al orinar o durante las relaciones sexuales. También puede haber dolor abdominal. Sin embargo, la mitad de las mujeres con tric no presentan indicio alguno.

La mayoría de los hombres infectados no presentan síntomas, pero aun así pueden infectar a sus parejas. Los hombres que perciben indicios, pueden incluir una secreción de poca densidad, clara o blanquecina por el pene o dolor al orinar. Los hombres con uretritis pueden realizarse un examen de tric en caso de no encontrarse otras ETS.



Examen

Se utiliza un hisopo para tomar fluidos de la vagina o del pene. El doctor luego analiza la presencia de protozoos bajo el microscopio. Debido a que este examen no siempre funciona, es preferible realizar un cultivo pero toma más tiempo y es más costoso.

En las mujeres, la tric en ocasiones se detecta durante el Papanicolaou. En los hombres, se puede analizar el semen en busca de tric.

Tratamiento

Se utiliza una droga llamada metronidazol o Flagyl. No se debe beber alcohol durante el tratamiento porque causa vómitos. Las mujeres embarazadas no pueden tomar esta droga durante los tres primeros meses del embarazo.

Es importante no tener relaciones sexuales hasta que todas las parejas estén curadas. Algunas personas pueden requerir ser tratadas más de una vez. Todas las parejas deben ser tratadas incluso si no presentan indicios. De no ser tratadas al mismo tiempo, pueden volver a contagiarse de tric.

Prevención

- **Conozca a sus parejas**—vaya con ellas a las evaluaciones de las ETS.
- **Use preservativos correctamente cada vez que tenga relaciones sexuales.**
- **Tenga menos parejas.** Mientras más parejas tenga, mayor será su riesgo de contraer tric.
- **Las pastillas para el control de la natalidad no previenen la infección.**

Aprenda más acerca de la tric

Si tiene preguntas o necesita más información, póngase en contacto con su médico, departamento de salud local, clínica comunitaria o llame a la Línea Directa Nacional sobre ETS al **1-800-227-8922**.

Este documento se encuentra disponible en otros formatos para personas con discapacidades a solicitud del interesado. Para presentar una solicitud, llame al 1-800-525-0127 (TTY/TDD 1-800-833-6388).



Dear Colleague,

The Washington State Department of Health (DOH) provides print-ready files (PDFs) of health education materials. To ensure that the original quality of the piece is maintained, please read and follow the instructions below and the specifications included for professional printing.

- **Use the latest version.** DOH materials are developed using the most current information available, are checked for clinical accuracy, and are field tested with the intended audience to ensure they are clear and readable. DOH programs make periodic revisions to educational materials, so please check this web site to be sure you have the latest version. DOH assumes no responsibility for the use of this material or for any errors or omissions.
- **Do not alter.** We are providing this artwork with the understanding that it will be printed without alterations and copies will be free to the public. Do not edit the text or use illustrations or photographs for other purposes without first contacting us. Please do not alter or remove the DOH logo, publication number or revision date. If you want to use a part of this publication for other purposes, contact the Office of Health Promotion first.
- **For quality reproduction:** Low resolution PDF files are intended for black and white or color desktop printers. They work best if you are making only one or two copies. High resolution PDF files are intended for reproducing large quantities and are set up for use by professional offset print shops. The high resolution files also include detailed printing specifications. Please match them as closely as possible and insist on the best possible quality for all reproductions.

If you have questions, contact:
Office of Health Promotion
P.O. Box 47833 Olympia, WA 98504-7833
(360) 236-3736

Sincerely,
Health Education Resource Exchange Web Team

P R I N T I N G S P E C I F I C A T I O N S

Title: **Trich** (card)

Size: 3.66 x 8.5"

Paper stock: Cougar 65# cover, white, smooth

Ink color: PMS 7496

Special instructions: 2-sided printing

DOH Pub #: 347-008